

# レナリドミドカプセル「BMSH」

Lenalidomide Capsules 「BMSH」

レナリドミド水和物カプセル

## カプセルシート

### 使用方法

#### レナリドミドカプセル「BMSH」

Lenalidomide Capsules 「BMSH」

レナリドミド水和物カプセル

#### カプセルシート

妊娠の可能性のある方は  
服用禁止(催奇形性注意)

 2.5mg

 5mg

冊目全  冊全  カプセル  
 (  月  日～  月  日分です)

調剤日	年 月 日	1日 <input type="text"/> カプセル
休薬期間	年 月 日～	年 月 日
お名前	さま	

次回診察時  月  日に


残ったお薬があれば、医療機関へこのカプセルシートをご持参いただくか、数量を報告してください。

**不要になったお薬は捨てずに  
調剤された医療機関までご持参ください。**



ご使用の際には以下をご留意ください。

- 調剤者がカプセルシートに薬剤をセットした後は、シートを切り離さないようにお願いいたします。
- カプセルシート内の薬剤はカプセルシートから出さずに保管をお願いいたします。
- 入院時はカプセルシートや1回量パックを活用するなどの適切な方法で本人確認を行い、与薬をお願いいたします。


## レナリドミドカプセル「BMSH」



① カプセルが入る方のページを図のようにジグザグ形に折りたたんでください。




② たたんだら、表紙側のページを巻き込み、端の突起を背表紙の穴に差し込んでください。




# カプセルのセットの仕方

## レナリドミドカプセル「BMSH」


① 開いてください。



② □の部分を開き、PTPシートを凸部を下にして、カプセルのポケットが○の穴に収まるようにセットしてください。




③ □の部分に戻し、△の部分をもの差込口に差し込んで固定してください。



④ ②③と同じ要領で、必要な数のPTPシートを  
残りのページにセットして行ってください。

※残葉を取り出す際は、裏面の点線に従ってはさみで  
切って取り出してください。



## レナリドミドカプセル「BMSH」

**ご注意ください**  
※カプセルシート内にご記入ください。

**避妊を徹底してください (妊娠回避)**  
※服用しなかったお薬は、カプセルシート内に残した状態で保管してください。

※このカプセルシート内のお薬をカプセルシートから出して保管しないでください。  
※このカプセルシート内のお薬服用期間中に、カプセルシートを切り離さないでください。  
(注)入薬時は、誤投与がないよう配薬を担当する医療関係者が監査確認をお願いします。

※1日1回、決められた時間に決められたカプセル数をコップ1杯程度の水またはぬるま湯で服用してください。  
※カプセルは噛まずにそのまま飲んでください。  
※カプセルは開けてはいけません。  
**服用し忘れても、絶対に2回分を1度に服用しないでください。**

服用状況: レナリドミドカプセル「BMSH」  2.5mg  5mg  
※体調の変化や何らかれになること、また服用しなかった場合にはその理由などをご記入ください。1日  錠

日付	回数	コメント	日付	回数	コメント
1/1 (月)	3	/( )			
1/2 (火)	3	めまい/( )			
1/3 (水)	3	/( )			
1/4 (木)	3	/( )			
1/5 (金)	0	飲み忘れ/( )			
1/6 (土)	3	/( )			
1/7 (日)	3	/( )			
/( )		/( )			
/( )		/( )			
/( )		/( )			
/( )		/( )			

### ▲ レナリドミドカプセル「BMSH」1日3カプセル、7日分の場合

**ご注意ください**  
※カプセルシート内にご記入ください。

**避妊を徹底してください (妊娠回避)**  
※服用しなかったお薬は、カプセルシート内に残した状態で保管してください。

※このカプセルシート内のお薬をカプセルシートから出して保管しないでください。  
※このカプセルシート内のお薬服用期間中に、カプセルシートを切り離さないでください。  
(注)入薬時は、誤投与がないよう配薬を担当する医療関係者が監査確認をお願いします。

※1日1回、決められた時間に決められたカプセル数をコップ1杯程度の水またはぬるま湯で服用してください。  
※カプセルは噛まずにそのまま飲んでください。  
※カプセルは開けてはいけません。  
**服用し忘れても、絶対に2回分を1度に服用しないでください。**

服用状況: レナリドミドカプセル「BMSH」  2.5mg  5mg  
※体調の変化や何らかれになること、また服用しなかった場合にはその理由などをご記入ください。1日  錠

日付	回数	コメント	日付	回数	コメント
1/1 (月)	2	/( )	1/12 (金)	2	/( )
1/2 (火)	2	/( )	1/13 (土)	2	/( )
1/3 (水)	2	/( )	1/14 (日)	2	/( )
1/4 (木)	2	/( )	/( )		
1/5 (金)	2	/( )	/( )		
1/6 (土)	2	/( )	/( )		
1/7 (日)	2	/( )	/( )		
1/8 (月)	0	飲み忘れ/( )	/( )		
1/9 (火)	2	/( )	/( )		
1/10 (水)	2	/( )	/( )		
1/11 (木)	2	/( )	/( )		

### ▲ レナリドミドカプセル「BMSH」1日2カプセル、14日分の場合

**ご注意ください**  
※カプセルシート内にご記入ください。

**避妊を徹底してください (妊娠回避)**  
※服用しなかったお薬は、カプセルシート内に残した状態で保管してください。

※このカプセルシート内のお薬をカプセルシートから出して保管しないでください。  
※このカプセルシート内のお薬服用期間中に、カプセルシートを切り離さないでください。  
(注)入薬時は、誤投与がないよう配薬を担当する医療関係者が監査確認をお願いします。

※1日1回、決められた時間に決められたカプセル数をコップ1杯程度の水またはぬるま湯で服用してください。  
※カプセルは噛まずにそのまま飲んでください。  
※カプセルは開けてはいけません。  
**服用し忘れても、絶対に2回分を1度に服用しないでください。**

服用状況: レナリドミドカプセル「BMSH」  2.5mg  5mg  
※体調の変化や何らかれになること、また服用しなかった場合にはその理由などをご記入ください。1日  錠

日付	回数	コメント	日付	回数	コメント
1/1 (月)	1	/( )	1/12 (金)	1	/( )
1/2 (火)	1	/( )	1/13 (土)	1	/( )
1/3 (水)	1	/( )	1/14 (日)	1	/( )
1/4 (木)	1	/( )	1/15 (月)	1	/( )
1/5 (金)	0	飲み忘れ/( )	1/16 (火)	1	/( )
1/6 (土)	1	/( )	1/17 (水)	1	/( )
1/7 (日)	1	/( )	1/18 (木)	1	/( )
1/8 (月)	0	飲み忘れ/( )	1/19 (金)	1	/( )
1/9 (火)	1	/( )	1/20 (土)	1	/( )
1/10 (水)	1	/( )	1/21 (日)	1	/( )
1/11 (木)	1	/( )			

### ▲ レナリドミドカプセル「BMSH」1日1カプセル、21日分の場合



RevMate®センター



お問い合わせ先

☎ 0120-071025

受付時間 9:00~18:00 (土日・祝日・年末年始を除く)

レブメイト



<https://www.revmate-japan.jp/>



ブリストル・マイヤーズ スクイブ販売株式会社