



知って
おきたい!


RevMate®とは

RevMate®にご協力いただいている看護師の皆さまへ、RevMateに関する情報や日頃の業務に役立つ情報をシリーズでお届けいたします。引き続き、レブラミド®・ポマリスト®の適正使用へのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

RevMateに関わる方々


RevMate (レブラミド・ポマリスト適正管理手順) はレブラミド・ポマリストの胎児への薬剤曝露を防止することを目的に策定されました。

レブラミド・ポマリストに関わる医療関係者をはじめ、患者さんとそのご家族、または患者さんの介護に携わる方といったすべての方々にRevMateの遵守が求められます。



患者さんの3つの区分

RevMateでは、成人の患者さんを性別、妊娠する可能性により「A男性」「B女性」「C女性」の3つに区分しています。



● 未成年患者さんを新たに登録・処方する際は、RevMateセンターへご連絡ください。

患者区分と遵守事項

RevMateでは、患者さんやそのパートナーの妊娠を回避するとともに、患者さん以外がレブラミド・ポマリストを服用することがないように、厳重に管理いただくための遵守事項を設けています。

遵守事項		A男性	B女性	C女性
催奇形性	「レブラミド・ポマリストは催奇形性を有する」ことの理解	●	●	●
	精子・精液の提供の禁止※1	●		
	授乳の禁止※1			●
	献血の禁止※1	●	●	●
妊娠回避	性交渉を控えるか、男女ともに適切な避妊措置を行う 男性:必ずコンドームを着用※1 女性パートナー:避妊法の実施(推奨)※1 女性:1種類以上の避妊法を実施※2 男性パートナー:必ずコンドームを着用※2	●		●
	妊婦との性交渉は完全に控える※1	●		
	妊娠反応検査と適切な避妊措置の確認※3			●
	・患者さんまたはそのパートナーが、妊娠した、 もしくは妊娠した可能性がある場合は処方医師に連絡する ・「C女性」の場合は、ただちにレブラミド・ポマリストの服用を中止する	●		●
保管・管理	レブラミド・ポマリストの保管には十分注意し、他人と共有または譲渡してはならない	●	●	●
	処方ごとに、処方医師に残薬数を伝えなければならない	●	●	●
	レブラミド・ポマリスト治療終了後は残薬を薬剤部(院内薬局)に返却する	●	●	●
	レブラミド・ポマリストのカプセルを開けて、薬剤を取り出してはならない	●	●	●

※1 治療中(休業期間を含む)、治療終了4週間後まで

※2 治療開始4週間前から治療終了4週間後まで(休業期間を含む)

※3 治療開始4週間前、治療開始時(開始3日前から直前)、4週間を超えない間隔、治療終了時、治療終了4週間後
ただし、治療開始予定日の4週間以上前から性交渉をしていないことが確認できた場合、治療開始4週間前の妊娠反応検査は省略できます。

薬剤管理者について

薬剤管理者とは、患者さん以外の方がレブラミド・ポマリストを誤飲するのを防いだり、不要となった薬剤の返却などを徹底したりするため、患者さんに代わって薬剤の管理を行う方のことです。「患者さんの身近な人(家族、親戚、近隣住民)」「医療関係者」「介護職員」などから、処方医師が以下の要件をすべて満たすと判断した方を認定します。

- レブラミド・ポマリストが胎児に障害を起こす可能性があることを理解している
- 処方されたレブラミド・ポマリストを患者さん以外に共有したり、譲ったりしてはならないことを理解している
- 患者さんと定期的に接する機会がある



- 患者さんご自身での管理が難しいと判断された場合などは、特に薬剤管理者の設置が必要です。処方医師にご相談ください。

(様式29)
レブラミド・ポマリスト適正管理手順に関する同意書(薬剤管理者)

薬剤管理者を設置する際に、本同意書をご記入いただく必要があります。

RevMate[®]センター



お問い合わせ先
☎ 0120-071025
受付時間 9:00~18:00 (日・祝日・年末年始を除く)

レブメイト



<https://www.revmate-japan.jp/>



ブリストル・マイヤーズ スクイブ 株式会社

RMG00234RB
2021年5月作成