



知って  
おきたい!

RevMate

## こんなときどうすればいい?

RevMate®にご協力いただいている看護師の皆さまへ、RevMateに関する情報や日頃の業務に役立つ情報をシリーズでお届けいたします。引き続き、レブラミド®・ポマリスト®の適正使用へのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

### こんなときどうすればいい?

RevMateに関して医療関係者の方から多く寄せられる問い合わせをまとめました。対応に困った際は、ぜひご覧ください。

#### Q1 薬剤を落としたときは、どうしたらよいですか。

処方医師または責任薬剤師に連絡してください。

#### Q2 薬剤が破損したときは、どうしたらよいですか。

薬剤曝露に気を付けて、薬剤部(院内薬局)にご返却ください。



- 薬剤曝露の可能性があるため、RevMateセンターへご連絡ください。
- レブラミド・ポマリストを受領した責任薬剤師は、曝露しないように注意し、医療廃棄物として確実に廃棄します。なお、廃棄する場合は、薬剤廃棄連絡書(追補7)を記入し、RevMateセンターまでFAX送信してください。

#### Q3 間違って他の人が薬剤を服用したときは、どうしたらよいですか。

- 処方医師または責任薬剤師に連絡してください。
- 誤投与した際の対処法は確立しておりません。  
通常の用法・用量の範囲で誤投与された場合には、経過を十分に観察し、症状や検査値異常などが認められた際は、適切な処置をお願いいたします。



- 誤投与された場合には、胎児への曝露の可能性についても確認のうえ、速やかにRevMateセンターへご連絡ください。

#### Q4 レブラミド・ポマリストを飲み忘れた場合、どうしたらよいですか。

1日1回服用の場合は、以下のように指導してください。

- 通常の服用時刻から12時間以内の場合  
飲み忘れ分を服用するよう指導してください。
- 通常の服用時刻から12時間以上経過している場合  
飲み忘れ分を服用せず、翌日の服用時刻に次の分を服用するよう指導してください。

なお、服用しなかった薬剤がある場合には、カプセルの種類と残薬数を処方医師に伝えてください。

## Q5 同じ医療機関で外来から入院になりました。注意点はありますか。

レブラミド・ポマリストによる治療中に患者さんが入院した場合は、RevMate手順に関わる薬剤師、病棟看護師などの医療関係者、または適切に薬剤管理を行うことのできる方が、処方医師および責任薬剤師と協力し、病院のルールに基づき他の薬剤とは区別し特別な薬剤としてレブラミド・ポマリストの適切な管理を行ってください。また、患者さんの服薬後は服薬確認をお願いいたします。

詳しくは、「知っておきたいRevMateシリーズ」の「No.6 配薬・与薬・服薬確認」「No.7 薬剤保管」「No.8 退院時指導」をご覧ください。

### No.6 配薬・与薬・服薬確認

### No.7 薬剤保管

### No.8 退院時指導

### 入院時・入所時のお願い

## Q6 他院で処方されたレブラミド・ポマリストがあるのですが、今後服用する予定がないときは、どうしたらよいですか。

処方元の医療機関に返却してください。返却が難しい場合は、薬剤廃棄連絡書(追補7)を記入し、RevMateセンターまでFAX送信してください。詳細は、RevMateセンターへご連絡ください。

RevMateセンター お問い合わせ先 **0120-071025** レブメイト <https://www.revmate-japan.jp/>

受付時間 9:00~18:00 (日・祝日・年末年始を除く)