



RevMate

**RevMate**

レナリドミド・ボマリドミド適正管理手順

# 服薬指導箋

— 保管・管理のお願い —

# レナリドミド・ポマリドミドを服用される方へ

**レナリドミド・ポマリドミドは特別な管理(レブメイトの遵守)が必要です。**  
～お腹の赤ちゃん(胎児)に重大な障害を及ぼす可能性があります～

お薬名  
記入欄

## 妊婦、赤ちゃん(胎児)への薬剤曝露を防止するために

**A男性** (および女性パートナー): 治療開始から治療終了4週間後まで性交渉を控えるか、性交渉時には避妊の徹底をお願いします。また、女性パートナーが妊娠中の性交渉は完全に控える必要があります。

**C女性** (および男性パートナー): 治療開始4週間前から治療終了4週間後まで性交渉を控えるか、性交渉時には規定された避妊法の徹底をお願いします。

## 注意していただきたいこと

- 他の人に譲渡しないでください。
  - 飲食物と区別された、子供の手の届かない場所に保管してください。
  - 紛失しないようご注意ください。紛失した場合は、処方医師、薬剤師に報告してください。
  - カプセルを開けずにそのまま飲んでください。
  - 飲み忘れや間違った数を飲んだ場合には、処方医師、薬剤師に報告してください。
  - 治療中ならびに治療終了4週間後までは献血をしないでください。
  - 授乳をしないでください。
  - レブメイトカードは、受診時に必ずご持参ください。
  - 入院や転院、老人福祉施設などに入所をするときは、特別な管理が必要なお薬を服用していることを伝え、レブメイトカードを提示してください。
  - 飲み残したカプセルの種類や数を処方医師に報告してください。
-  ● 治療終了時に飲み残したカプセルがある場合は、薬剤部(院内薬局)で回収します。その際、返金はありません。

## 処方医師からの注意事項を必ず守ってください

- その他に関する詳細は、小冊子「レブメイトのご案内」またはレブメイトホームページをご覧ください。
- 気になることがあれば、処方医師、薬剤師、看護師にご相談ください。

レブメイトホームページ

レブメイト



<https://www.revmate-japan.jp/>



## 表面の「注意していただきたいこと」を徹底してください。



- レナリドミド・ポマリドミドは、ヒトで催奇形性を示すサリドマイドに似たお薬です。そのため、特別な管理（レブメイトの遵守）が必要なお薬です。

### 医療機関の皆さまへ

#### 誤投与防止のための配薬・与薬・服薬確認の徹底と薬剤保管に関するお願い

##### 配薬

**ダブルチェック**を行ってください。

##### 与薬

必ず**本人確認**を行ってください。

##### 服薬確認

患者さんが服用した後は、**服薬確認**を行ってください。

##### 薬剤保管

**「レナリドミド・ポマリドミドは特別な管理（レブメイトの遵守）を必要とする薬剤である」**ことが容易に認識できるよう、他のお薬とは区別して保管<sup>※1</sup>してください。

- 保管方法は、責任薬剤師またはレブメイトに関わる薬剤師に確認してください。
- 患者さんが服用する必要がなくなったレナリドミド・ポマリドミドは、病院の薬剤部（院内薬局）に返却してください。<sup>※2</sup>
- レナリドミド・ポマリドミドを紛失した場合には、すぐに処方医師または責任薬剤師に報告してください。<sup>※2</sup>
- 他院からの薬剤の持ち込み時や、一時帰宅時などの薬剤管理に関しても、施設内で適切な手順を設定してください。

※1 各医療機関の基準に基づき管理してください。

※2 レブメイト登録施設ではない場合は、レブメイトセンターにご連絡ください。

詳細については、RevMateホームページをご覧ください。

### 患者さんへの指導のお願い

表面に記載の「妊婦、赤ちゃん（胎児）への薬剤曝露を防止するために」および「注意していただきたいこと」を遵守いただけるよう、患者さんへご指導ください。

