

RevMate® 遵守状況確認票 C未成年女性

☐ 枠線から出ないように記入してください。

チェックボックスは該当する ☐ に ☒ を記入してください。 ☐ は訂正用です。

医療
機関名

沢井製薬

確認日	20 年 月 日	処方医師名			
患者ID	8100	外来入院	外来 ☐ 入院 ☐	薬剤切替時の説明済	☐
患者同意の取得	取得した (初回・薬剤・ 区分変更時)	薬剤管理者 設置要否	要 ☐ 不要 ☐	疾患 (疾患変更時のみ)	MM ☐ MDS (5q-) ☐ その他 ☐
1. 確認項目:			医師確認		
下記の項目に関して、十分説明した または、患者さんは説明しなくとも十分理解していることを確認した			外来	入院	
催奇形性	● 催奇形性リスクおよび胎児への影響 ● 献血の禁止			はい ☐	
避妊	● 性交渉を控えるか、有効な避妊措置をとる(治療終了4週間後まで) ● 有効な避妊措置方法 ● 無月経の場合でも、避妊措置をとる ● 妊娠反応検査を実施する(治療開始時、治療中は4週間を超えない間隔ごと、治療中止時、治療終了4週間後) ● 妊娠した、もしくは妊娠した可能性がある場合はただちに服用を中止して処方医師に相談する			はい ☐	
保管	● 他人と共有または譲渡してはならない ● 本剤を廃棄してはならない ● 飲み残した本剤の残薬数を通院時に処方医師に伝える ● 本剤を紛失しないよう管理する ● 治療終了後の残薬は、薬剤部(院内薬局)に返却する			はい ☐	
残薬	残薬なし ☐ ☐ 1剤目規格 1剤目カプセル数 2剤目規格 2剤目カプセル数 レナリドミド ☐ ☐ 8.8 mg × 888 カプセル : 8.8 mg × 888 カプセル				
確認事項	● 定期確認票の記入内容を確認したうえで、患者さんに薬剤に関する必要な説明を行った または 定期確認票の 提出時期でないことを確認した(含む、新規患者さんの場合) ※責任薬剤師が確認する場合、○は不要			はい ☐	
2. 妊娠検査:			初回処方用	継続処方用	
本剤の治療開始時4週間前の妊娠反応検査の結果をご記入ください 4週間以上前から性交渉を控えている場合は「不要」に○を記入してください			陰性 ☐ 不要 ☐		
今回の妊娠反応検査の結果をご記入ください			陰性 ☐	陰性 ☐	
3. 避妊措置状況の確認:			医師確認		
4週間前から性交渉を控えるか、以下の方法で男女とも避妊を行っていた 女性:経口避妊薬、子宮内避妊器具、両側卵管結紮術のいずれかを実施 男性:必ずコンドームを着用			はい ☐		
4. 臨床検査値などの確認:			医師確認		
妊娠反応検査を実施し、結果は陰性であった			はい ☐		
添付文書の記載に従い、本治療に際し血液検査など、問題となる所見がないことを確認した			はい ☐		
上述の処方要件を満たすことを確認した(「完了」に○がない場合、本剤は患者さんに交付されません)			医師確認	完了 ☐	
5. 薬剤師記入項目:					
調剤	処方する薬剤 レナリドミド カプセル「サワイ」 ☐	1剤目規格 1剤目カプセル数 2剤目規格 2剤目カプセル数 調剤なし ☐ 8.8 mg × 888 カプセル : 8.8 mg × 888 カプセル			
上述の内容および処方箋の記載事項を確認した			薬剤師確認	完了 ☐	
定期確認票の記入内容を確認したうえで、患者さんに薬剤管理に関する必要な説明を行った または定期確認票の提出時期でないことを確認した(含む、新規患者さんの場合)			はい ☐		
処方医師 カナ氏名				担当 薬剤師名	
薬局 ID				連絡先 TEL	

※入院患者さんのレナリドミドカプセル「サワイ」を病棟内で管理する場合、第三者が薬剤曝露しないよう、保管・配薬・与薬してください。

以上で処方要件の確認は終了です。