

レナリドミド・ポマリドミドの服用を
中止または休薬する

患者さんおよび ご家族・パートナーの方へ

医療関係者の皆さまへ

これからレナリドミド・ポマリドミドの服用を
中止または休薬される患者さんおよび
ご家族・パートナーの方へお渡してください。

レナリドミド・ポマリドミドの服用を中止または 休薬する患者さんおよびご家族・パートナーの方へ

治療終了4週間後まで以下を徹底してください。

性交渉を控えるか、性交渉を行う場合は、妊娠する力・させる力の有無にかかわらず必ず避妊をしてください。

A男性

- 必ずコンドームを着用してください。
妊婦との性交渉は完全に控えてください。
- 精子・精液の提供はしないでください。
- 献血をしないでください。

C女性

- 1種類以上の避妊法*を実施し、男性パートナーは必ずコンドームを着用してください。
- 妊娠反応検査のために来院してください（治療終了時と治療終了4週間後）。
- 授乳をしないでください。
- 献血をしないでください。

B女性

- 献血をしないでください。

※避妊法の詳細については、レブメイト®ホームページをご確認ください。



上記を守らなければならない期間

(医療担当者記載欄)

最終服用日	年	月	日	～
	年	月	日	まで

医療担当者名: _____

患者さんチェック欄: ☐ 上記の説明を理解しました。

レブメイト®ホームページ

レブメイト



<https://www.revmate-japan.jp/>



作成：ブリストル・マイヤーズ スクイブ 株式会社