RevMate

RevMate®

レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順

服薬指導箋

ー保管・管理のお願いー

レナリドミド・ポマリドミドを服用される方へ

あなたが服用している薬剤は、お腹の赤ちゃん（胎児）に重大な障害を及ぼす恐れがありますので、特別な管理が必要です

妊婦さん、赤ちゃん（胎児）を守るために避妊を徹底してください。

A男性 **妊娠する力・させる力の有無にかかわらず、服用開始から服用中止4週間後まで（休薬期間を含む）性交渉を控えるか、避妊（コンドームの着用）を徹底してください。**
女性パートナーが妊娠中の場合は性交渉は完全に控えてください。
なお、女性パートナーにおいても、服用開始から服用中止4週間後まで（休薬期間を含む）規定された避妊法※が推奨されます。

C女性 **服用開始4週間前から服用中止4週間後まで（休薬期間を含む）性交渉を控えるか、規定された避妊法※を徹底してください。その際、男性パートナーは必ずコンドームを使用してください。**

※避妊法の詳細については、レブメイト®ホームページをご確認ください。

守らなければならないこと

● 服用中止4週間後まで

A男性

- ☐ 避妊（コンドームの着用）を実施してください。妊婦との性交渉は完全に控えてください。
- ☐ 精子・精液の提供はしないでください。
- ☐ 献血をしないでください。

C女性

- ☐ 規定された避妊法を実施してください。男性パートナーは必ずコンドームを着用してください。
- ☐ 授乳をしないでください。
- ☐ 献血をしないでください。

B女性

- ☐ 献血をしないでください。

● 服用中止まで

A男性 **B女性** **C女性**

- ☐ カプセルを開けずにそのまま飲んでください。
- ☐ 処方医師から指示された内容とは異なった飲み方をした場合は、処方医師、薬剤師に報告してください。
- ☐ 不要となった薬剤は薬剤部（院内薬局）に返却してください。
- ☐ 紛失した場合は、処方医師、薬剤師に報告してください。
- ☐ 他の人に譲渡しないでください。
- ☐ 飲食物と区別された、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ☐ レブメイト®カードは、受診時に必ずご持参ください。

医療担当者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　年　月　日

入院（転院）・入所の際に医療関係者に提示してください

医療機関の皆さまへ

- レナリドミド・ポマリドミドは、ヒトで催奇形性を示すサリドマイドによく似たお薬です。そのため、特別な管理（RevMate®の遵守）が必要です。
  誤投与防止を徹底するとともに、医療関係者の皆さまも薬剤曝露にご注意ください。

表面の「守らなければならないこと」を徹底してください。

誤投与防止のための薬剤保管と、配薬・与薬・服薬確認徹底のお願い

薬剤保管

「レナリドミド・ポマリドミドは特別な管理（RevMate®の遵守）を必要とする薬剤である」ことが容易に認識できるよう、他のお薬とは区別して保管※1してください。

- 薬剤曝露を防止するため脱カプセルは絶対にしないでください。
- 不要なレナリドミド・ポマリドミドは勝手に廃棄せず、薬剤部（院内薬局）に返却してください。※2
- 薬剤を紛失した場合は、処方医師または責任薬剤師に報告してください。※2

※1 各医療機関の基準に基づき管理してください。
※2 RevMate®登録医療機関ではない場合は、RevMate®センターにご連絡ください。

配　薬　**患者名、薬剤名、用量についてダブルチェック**を行ってください。

与　薬　必ず**本人確認**を行ってください。

服薬確認　患者さんが服用した後は、**服薬確認**を行ってください。

詳細については、RevMate®ホームページをご覧ください。

レブメイト®ホームページ　レブメイト　https://www.revmate-japan.jp/

作成：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

RevMate®およびレブメイト®は米国Celgene Corporation（Bristol-Myers Squibbの関係会社）の登録商標です。

RMG00750RB
2026年6月作成

作成：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

RevMate®およびレブメイト®は米国Celgene Corporation（Bristol-Myers Squibbの関係会社）の登録商標です。

RMG00750RB
2026年6月作成