RevMate®

レナリドミド・ポマリドミドの服用を
中止または休薬する

患者さんおよび
ご家族・パートナーの方へ

医療関係者の皆さまへ

これからレナリドミド・ポマリドミドの服用を
中止または休薬される患者さんおよび
ご家族・パートナーの方へお渡しください。

レナリドミド・ポマリドミドの服用を中止または休薬する患者さんおよびご家族・パートナーの方へ

服用中止4週間後まで以下を徹底してください。

性交渉を控えるか、性交渉を行う場合は、妊娠する力・させる力の有無にかかわらず必ず避妊をしてください。

A男性

- 必ずコンドームを着用してください。
  妊婦との性交渉は完全に控えてください。
- 精子・精液の提供はしないでください。
- 献血をしないでください。

C女性

- 1種類以上の避妊法※を実施し、男性パートナーは必ずコンドームを着用してください。
- 妊娠反応検査のために来院してください（服用中止時と服用中止4週間後）。
- 授乳をしないでください。
- 献血をしないでください。

B女性

- 献血をしないでください。

※避妊法の詳細については、レブメイト®ホームページをご確認ください。

上記を守らなければならない期間

（医療担当者記入欄）

最終服用日　　年　　月　　日　～

　　年　　月　　日まで

医療担当者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

患者さんチェック欄：☐ 上記の説明を理解しました。

レブメイト®ホームページ

レブメイト

https://www.revmate-japan.jp/

作成：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

レブメイト®は米国Celgene Corporation（Bristol-Myers Squibbの関係会社）の登録商標です。

RMG00749RB
2026年6月作成

作成：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

RevMate®およびレブメイト®は米国Celgene Corporation（Bristol-Myers Squibbの関係会社）の登録商標です。

RMG00749RB
2026年6月作成